

INCIDENCIA DE *Echinococcus hidatidico* EN BOVINOS FAENADOS EN EL MATADERO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA¹

.....²; Castedo, VJ³

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia - 1969

RESUMEN

El estudio se efectuó con el objetivo de determinar la frecuencia de la Hidatidosis en vísceras juzgadas de bovinos en el matadero Municipal "Pampa de la Isla" de Santa Cruz de la Sierra en el departamento de Santa Cruz. De 1.500 bovinos faenados, en los cuales se inspeccionó microscópicamente el hígado y pulmón para encontrar el Quiste hidatídico, encontró 32 animales positivos a Quiste hidatídico, representando el 2,1%. Haciendo inferencia de la información disponible, la relación porcentual de hígados, es del 100% para dicho periodo, sobre el total de órganos inspeccionados y decomisados en ese periodo. Se demuestra que la Hidatidosis se encuentra entre las causas de decomiso del hígado en el matadero Municipal "Pampa de la Isla", sin afectar otros órganos.

¹ Tesis de Grado presentada por Castedo V., Jesús, para obtener el título de Médico Veterinario Zootecnista.

³ Médico Veterinario. Profesor de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAGRM. Santa Cruz, Bolivia.

⁴ Reside en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.